

KOLIČINA MLIJEKA NAKON TELJENJA KRAVE OD ZNATNOG JE UTJECAJA ZASUŠIVANJE KRAVE PRIJE TELJENJA

Kolika će biti vrijednost krave muzare nakon teljenja zavisit će od nekoliko čimbenika kao i od nasljednih i nenasljednih čimbenika, starosti krave, njene hranidbe, godišnjeg doba, sunčane svjetlosti, klimatskih faktora, temperature i drugih čimbenika u koje spada i akt zasušivanja bređe krave pred teljenje o kojem zasušivanu kao važnoj zootehničkoj mjeri govori i ovaj napis.

Razlika je u hranidbi muznih i zasušenih krava te krava koje treba pripremiti za novu laktaciju za novo teljenje. Iza teljenje krave se muzu, jedne kraće druge duže. Prosječno se muzu 9-10 mjeseci nakon teljenja, ako svake godine daju po 1 tele. Gdje je servis period tj. razmak između 2 teljenja duži može kod dobrih krava i vrijeme muže biti duže i do 12-14 mjeseci. Najbolje je da se krava teli redovito svake godine, pa je prosjek trajanja muže 9-10 mjeseci.

Krave treba bar 6-8 tjedana prije teljenja zasušiti i hranidbu podesiti posebnoj grupi krava zavisno od broja grla u stadu tj. ako se radi o većem broju krava. Zasušivanjem krave da bi ih bolje pripremili za novo teljenje i novu laktaciju ako se radi o malim gospodarstvima s jednom ili 2 krave zasušivanje baš nije nužno, ali ih je bolje zasušiti i u takvim prilikama, da bi nam bilo mlijeko vraćeno većom količinom nakon teljenja.

Da bi mogli do maksimuma iskoristiti proizvodni kapacitet krave moramo je htaniti po principima zasušenja, a zatim ih pravilno uvesti u mliječnost iza teljenja do njenog potpunog razvoja. U takove pripreme spada i zasušenje prije teljenja.

Zasušenje se sastoji u ukidanju broja dnevne mužnje i postupno smanjivanje krmiva u hranidbi ispuštajući prvenstveno koncentrate, već kod krava koje daju u vrijeme zasušenja manje od 10 l mlijeka. Orijetaciono se iznosi primjer zasušenja krava koje daju 15-21 l mlijeka što je danas na obiteljskim farmama skoro normalna produkcija. Zasušivanje je postupno pa se 8 dana ukidaju najprije koncentрати iz obroka, a krmu smanjimo do mjere koja bi dotjecala za uzdržnu hranu oko 5 litara dnevne produkcije mlijeka.

Deveti dan ukidamo podnevnu mužnju i tako 4 dana, zatim 3 dana ukinemo večernju mužnju, pa muzemo samo ujutro, a sedamnaesti dan ukinemo i jutarnju mužnju. Ako vime naliže još odviše jako, dvaput preko dana izmuzemo i zatim prestanemo sa mužom. Zasuešenoj kravi (grupi krava) zatvorimo vimena utiskivanjem čepića borvazelina (dr. Šmaljcelj) u otvore sise.

Za način zasušivanja krava koje daju više od 20 litara mlijeka u vrijeme zasušivanja, a koje se isto moraju zasušiti dobro se je savjetovati sa stručnjacima koji će odrediti postupak i tijekom zasušivanja, a koji je sličan opisanome (orijetaciono od 15-20 litara).

Nadalje treba računati da se 8 dana nakon zasušivanja počinje s jačom hranidbom krava. Ta priprema je potrebna zbog pojave perioda burne laktacije iza teljenja, a i tele se najjače razvija u krvi zadnji mjesec starosti kad tele postiže 70% rasta od svih 9 mjeseci koliko traje bređost krave.

Nikola Jagačić dip.ing agr.