

## **TOV JUNADI SVJEŽIM I SILIRANIM REZANCIMA ŠEĆERNE REPE**

U blizini šećerana i kod poljodjelaca koji se bave proizvodnjom šećerne repe moguće je toviti junad svježim ili siliranim rezancima šećerne repe (Virovitica, Županja i dr.).

U takovom tovu treba računati da su rezanci šećerne repe siromašni u bjelančevinama i hranjivim jedinicama pa je stoga potrebno povećati davanje kukuruzne prekrupe, sijena i uljane silaže.

Najčešće se rezanci daju junadi da jedu po volji. Rezanci ne smiju ostati nepojedeni, jer se brzo kvare i podložni su kvarenju zbog čega bi moglo doći do oboljenja grla ako bi junad trošila u hranidbi pokvarene rezance.

U periodu tova junadi računa se da po tovljeniku treba oko 5 kg prekrupe kukuruza, 1,5 kg sijena lucerke ili dobrog livadnog sijena te oko 1/2 kg sačme suncokreta.

Računa se da june pojede oko 15 kg rezanaca dnevno uz prosječni dnevni prirast oko 1000 grama.

Pri hranidbi s većim količina svježih repinih rezanaca šećerne repe treba se povećati davanje krede na oko 1,5 % da se neutralizira višak kiselina.

*Nikola Jagačić dipl.ing.agr.*